

Gamme **PHYTOSAN**

TRAITEMENT DES ESPACES VERTS



TERSOL GAZON

Dés herbant sélectif des gazons de graminées



Les +

- 100 % systémique.
- Efficace sur la totalité des mauvaises herbes dicotylédones.
- Excellent rapport qualité/prix sur gazons très infestés.



DOSES ET USAGES HOMOLOGUES

Dés herbage des gazons de graminées : 6 l/ha



TERSOL GAZON

Dés herbant sélectif des gazons de graminées

▶ COMPOSITION

360 g/l de 2,4-MCPA sous forme de sels de sodium et de potassium.

30 g/l de Dicamba sous forme de sels de sodium et de potassium.

A.M.M. n° 7900323 détenue par Sipcam Phyteurop, 55, rue Raspail – CS 70104, 92594 LEVALLOIS PERRET Cedex.

TERSOL GAZON : Nom homologué déposé par Hygiène et Nature.

Classement H319, H411 Délai de ré-entrée 24 h. ZNT : 5 m

▶ UTILISATION

Dés herbage des gazons d'ornement nus ou arborés, pelouses, terrains de sport et golfs.

▶ MODE D'ACTION / EFFICACITE

Les deux matières actives sont absorbées par les feuilles des mauvaises herbes, puis véhiculées dans les plantes par la sève (action foliaire systémique). Le Dicamba possède également une action racinaire. Ainsi, **TERSOL GAZON** détruit la quasi-totalité des mauvaises herbes dicotylédones annuelles et vivaces, et tout particulièrement, celles à enracinement profond. Il élimine pissenlit, trèfle, plantain, marguerite, pâquerette, liseron, etc.

TERSOL GAZON est parfaitement sélectif vis à vis de la très grande majorité des espèces de graminées entrant dans la composition des gazons. Il peut être appliqué dès la première année d'installation sur un gazon bien implanté.

▶ DOSES ET USAGES HOMOLOGUES

Dés herbage des gazons de graminées : 6 l/ha

▶ MODE D'EMPLOI

1) Epoque d'utilisation :

De mars à octobre, mais de préférence au printemps par temps poussant après la 2^{ème} ou 3^{ème} tonte, ou bien au début de l'automne.

2) Doses d'emploi :

4 à 6 l/ha dans 300 à 700 l d'eau selon le degré d'infestation, soit 40 à 60 ml dans 3 à 7 l d'eau pour traiter 100 m². N'utilisez qu'en application localisée sur moins de 30 % de la surface.

3) Précautions d'emploi :

- Traiter à basse pression (2 à 3 bars) en évitant tout entraînement du brouillard de pulvérisation sur les feuilles des plantes voisines.

- Ne pas traiter par forte chaleur, en période de gel, de vent ou de pluie.

- Ne pas arroser dans la journée qui suit le traitement, ne pas tondre ou faucher dans la dizaine de jours suivant l'application.

- Ne pas utiliser les trois coupes suivant le traitement pour la confection de compost.

- Traiter au moins 3 jours après une tonte.

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

▶ CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres
(code article : 69611/5)

